

1050

SECONDARY SCHOOL EXAMINATION - 2025
माध्यमिक स्कूल परीक्षा - 2025

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड
Question Booklet
Set Code

J

(ANNUAL / वार्षिक)

MATHEMATICS
(Compulsory)

गणित

(अनिवार्य)

विषय कोड :

Subject Code :

कुल प्रश्न : $100 + 30 + 8 = 138$

Total Questions : $100 + 30 + 8 = 138$

कुल मुद्रित पृष्ठ : 44

Total Printed Pages : 44

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)

(पूर्णांक : 100)

[Time : 3 Hours 15 Minutes]

[Full Marks : 100]

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

Instructions for the candidates :

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
4. प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
1. Candidates must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
3. Figures in the right hand margin indicate full marks.
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.

5. यह प्रश्नपत्र दो खण्डों में है — खण्ड-अ एवं खण्ड-ब।

6. खण्ड-अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पचास से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराये गये OMR उत्तर पत्रक में दिये गये सही विकल्प को नीले / काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के ह्वाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का OMR उत्तर-पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।

7. खण्ड-ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।

8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।

5. This question booklet is divided into two sections — Section-A and Section-B.

6. In Section-A, there are 100 objective type questions, out of which any 50 questions are to be answered. First 50 answers will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each question carries 1 mark. For answering these darken the circle with **blue / black ball pen** against the correct option on OMR Answer sheet provided to you. **Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR-sheet, otherwise the result will be treated invalid.**

7. In Section-B, there are 30 short answer type questions, out of which any 15 questions are to be answered. Each question carries 2 marks. Apart from these, there are 8 long answer type questions, out of which any 4 questions are to be answered. Each question carries 5 marks.

8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

खण्ड - अ / SECTION - A

वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित करें।

$$50 \times 1 = 50$$

Question Nos. 1 to 100 have four options, out of which only one is correct. Answer any 50 questions. You have to mark your selected option on the OMR-Sheet.

$$50 \times 1 = 50$$

1. किसी बाह्य बिन्दु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। यदि $PA = 8$ सेमी तो $PB =$

- (A) 6 सेमी (B) 8 सेमी
(C) 12 सेमी (D) 16 सेमी

From an external point P , two tangents PA and PB are drawn on a circle. If $PA = 8$ cm then $PB =$

- (A) 6 cm (B) 8 cm
(C) 12 cm (D) 16 cm

2. यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिन्दु P से केन्द्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं एवं $\angle APB = 80^\circ$ तो $\angle POA =$

- (A) 40° (B) 50°
(C) 80° (D) 60°

If PA and PB are the tangents drawn from an external point P to a circle with centre at O and $\angle APB = 80^\circ$ then $\angle POA =$

- (A) 40° (B) 50°
(C) 80° (D) 60°

J

[110]

3. वृत्त पर स्थित किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिन्दु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन-सा कोण बनाती है ?

- (A) 30° (B) 45°
(C) 60° (D) 90°

What is the angle between the tangent drawn at any point of a circle and the radius passing through the point of contact ?

- (A) 30° (B) 45°
(C) 60° (D) 90°

4. दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 : 4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है

- (A) 3 : 4 (B) 4 : 3
(C) 9 : 16 (D) 16 : 9

The ratio of the radii of two circles is 3 : 4 ; then the ratio of their areas is

- (A) 3 : 4 (B) 4 : 3
(C) 9 : 16 (D) 16 : 9

5. 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केन्द्रीय कोण 30° है, का क्षेत्रफल है

- (A) 515 सेमी^2 (B) 416 सेमी^2
(C) 462 सेमी^2 (D) 406 सेमी^2

J

The area of the sector of a circle of radius 42 cm and central angle 30° is

- (A) 515 cm^2 (B) 416 cm^2
(C) 462 cm^2 (D) 406 cm^2

6. दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात $5 : 7$ है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है

- (A) 7 : 5 (B) 5 : 7
- (C) 25 : 49 (D) 49 : 25

The ratio of the circumferences of two circles is $5 : 7$; then the ratio of their radii is

- (A) 7 : 5 (B) 5 : 7
(C) 25 : 49 (D) 49 : 25

7. $7 \sec^2 A - 7 \tan^2 A =$

- (A) 49 (B) 7
 (C) 14 (D) 0

8. यदि $x = a \cos \theta$ और $y = b \sin \theta$ तो $b^2 x^2 + a^2 y^2 =$

- (A) a^2b^2 (B) ab
(C) a^4b^4 (D) $a^2 + b^2$

If $x = a \cos \theta$ and $y = b \sin \theta$ then $b^2 x^2 + a^2 y^2 =$

- (A) a^2b^2 (B) ab
(C) a^4b^4 (D) $a^2 + b^2$

J

[110]

J

9. एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मी की दूरी पर 60° है, तो मीनार की ऊँचाई है

- (A) 10 मी (B) $10\sqrt{3}$ मी
(C) $15\sqrt{3}$ मी (D) $20\sqrt{3}$ मी

The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 10 m from its base is 60° ; then the height of the tower is

- (A) 10 m (B) $10\sqrt{3}$ m
(C) $15\sqrt{3}$ m (D) $20\sqrt{3}$ m

10. एक पतंग पृथ्वी से 30 मी की ऊँचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60° का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई है

- (A) $30\sqrt{2}$ मी (B) $35\sqrt{3}$ मी
(C) $20\sqrt{3}$ मी (D) $45\sqrt{2}$ मी

A kite is at a height 30 m from the earth and its string makes an angle 60° with the earth. Then the length of the string is

- (A) $30\sqrt{2}$ m (B) $35\sqrt{3}$ m
(C) $20\sqrt{3}$ m (D) $45\sqrt{2}$ m

11. वर्ग अंतरालों 2 - 5, 5 - 8, 8 - 11, ... के वर्गों की लंबाई है

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 3.5

J

The length of the class intervals of the classes, 2 - 5, 5 - 8, 8 - 11, ... is

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 3.5

12. यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या है

- (A) 4.5 (B) 9 13 5 2
(C) 21 (D) 15

If the mean of four consecutive odd numbers is 6 then the largest number is

- (A) 4.5 (B) 9
(C) 21 (D) 15

13. प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है

- (A) 4 (B) 6
(C) 7 (D) इनमें से कोई नहीं

The mean of first 6 even natural numbers is

- (A) 4 (B) 6
(C) 7 (D) none of these

14. $1 + \cot^2 \theta =$

- (A) $\sin^2 \theta$ (B) $\operatorname{cosec}^2 \theta$
(C) $\tan^2 \theta$ (D) $\sec^2 \theta$

J

[110]

15. 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 5 का बहुलक है

- (A) 5 ~~9~~ 3 (B) 7
(C) 8 (D) 9

The mode of 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 5 is

- (A) 5 (B) 7
(C) 8 (D) 9

16. यदि $P(E) = 0.02$ तो $P(E')$ बराबर है

- (A) 0.02 (B) 0.002
(C) 0.98 (D) 0.97

If $P(E) = 0.02$ then $P(E')$ is equal to

- (A) 0.02 (B) 0.002
(C) 0.98 (D) 0.97

17. दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। ऊपर आनेवाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है ?

- (A) $\frac{1}{36}$ (B) $\frac{1}{6}$
(C) $\frac{5}{18}$ (D) $\frac{5}{36}$

Two dice are thrown at the same time. What is the probability that the difference of the numbers appearing on top is zero ?

- (A) $\frac{1}{36}$ (B) $\frac{1}{6}$
(C) $\frac{5}{18}$ (D) $\frac{5}{36}$

J

18. दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है

(A) $\frac{1}{2}$

☒ (B) $\frac{1}{3}$

☒ (C) $\frac{1}{4}$

(D) 1

Handwritten notes for Q18:
 HH
 HT
 TH
 TT

The probability of getting heads on both the coins in throwing two coins is

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) 1

19. एक वर्ष में एक महीना यदृच्छया चुना जाता है। इसके जून या सितम्बर होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{1}{12}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{1}{4}$

A month is selected at random in a year. The probability of it being June or September is

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{1}{12}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{1}{4}$

20. एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता है

☒ (A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{2}{3}$

Handwritten notes for Q20:
 1, 2, 3, 4, 5, 6
 1, 2, 3, 4, 5, 6

J

[110]

The probability of getting a number 4 or 5 in throwing a die is

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$
 (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{2}{3}$

21. दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 : 125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है

- (A) 25 : 8 (B) 25 : 16
 (C) 16 : 25 (D) इनमें से कोई नहीं

The ratio of the volumes of two spheres is 64 : 125. Then the ratio of their surface areas is

- (A) 25 : 8 (B) 25 : 16
 (C) 16 : 25 (D) none of these

22. दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4 : 5 है एवं उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 6 : 7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात है

- (A) 96 : 125 (B) 96 : 175
 (C) 175 : 96 (D) 20 : 63

The radii of two cylinders are in the ratio 4 : 5 and their heights are in the ratio 6 : 7. Then the ratio of their volumes is

- (A) 96 : 125 (B) 96 : 175
 (C) 175 : 96 (D) 20 : 63

23. R त्रिज्या वाले अर्द्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है ?

- (A) πR^2 (B) $2\pi R^2$
 (C) $3\pi R^2$ (D) $4\pi R^2$

SS/A/605

Page 10 of 44

$$\frac{2\pi}{3} (4)^2 h = \frac{2\pi}{3} \times (5)^2 h$$

$$16 \times 6 = 25 \times 7$$

$$96 = 175$$

What is the total surface area of a hemisphere of radius R ?

- (A) πR^2 (B) $2\pi R^2$
(C) $3\pi R^2$ (D) $4\pi R^2$

24. यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी^2 है और त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊँचाई है

- (A) 10 सेमी (B) 20 सेमी
(C) 40 सेमी (D) 30 सेमी

If the curved surface area of a cone is 880 cm^2 and its radius is 14 cm, then its slant height is

- (A) 10 cm (B) 20 cm
(C) 40 cm (D) 30 cm

25. यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई $2\sqrt{3}$ सेमी है तो इसके कोर की लम्बाई है

- (A) 2 सेमी (B) $2\sqrt{3}$ सेमी
(C) 3 सेमी (D) 4 सेमी

If the length of the diagonal of a cube is $2\sqrt{3}$ cm, then the length of its edge is

- (A) 2 cm (B) $2\sqrt{3}$ cm
(C) 3 cm (D) 4 cm

J

[110]

26. किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा ?

(A) दो गुना

(B) चार गुना

(C) छः गुना

(D) बारह गुना

If the edge of a cube is doubled then the total surface area will become how many times of the previous total surface area ?

(A) Two times

(B) Four times

(C) Six times

(D) Twelve times

27. किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्द्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है

(A) 2 : 1

(B) 4 : 9

(C) 3 : 2

(D) 4 : 3

The ratio of the total surface area of a sphere and that of a hemisphere having the same radius is

(A) 2 : 1

(B) 4 : 9

(C) 3 : 2

(D) 4 : 3

28. यदि किसी अर्द्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेमी^2 है, तो उसकी त्रिज्या है

(A) 7 सेमी

(B) 14 सेमी

(C) 21 सेमी

(D) 28 सेमी

J

[110]

If the curved surface area of a hemisphere is 1232 cm^2 then its radius is

- (A) 7 cm (B) 14 cm
(C) 21 cm (D) 28 cm

29. यदि $\cos \theta + \cos^2 \theta = 1$ तो $\sin^2 \theta + \sin^4 \theta$ का मान है

- (A) -1 (B) 1
(C) 0 (D) 2

If $\cos \theta + \cos^2 \theta = 1$ then the value of $\sin^2 \theta + \sin^4 \theta$ is

- (A) -1 (B) 1
(C) 0 (D) 2

30. $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} =$

- (A) $\sec^2 A$ (B) -1
(C) $\cot^2 A$ (D) $\tan^2 A$

31. यदि $A(0, 1)$, $B(0, 5)$ एवं $C(3, 4)$ किसी ΔABC के शीर्ष हैं, तो ΔABC का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है

- (A) 16 (B) 12
(C) 6 (D) 4

J

[110]

If $A(0, 1)$, $B(0, 5)$ and $C(3, 4)$ are the vertices of any $\triangle ABC$, then the area (in square unit) of $\triangle ABC$ is

- (A) 16 (B) 12
(C) 6 (D) 4

32. $\tan 10^\circ \cdot \tan 23^\circ \cdot \tan 80^\circ \cdot \tan 67^\circ = \tan 90^\circ + \tan 69^\circ$

- (A) 0 (B) 1
(C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

33. यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात $100 : 144$ है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है

- (A) $10 : 8$ (B) $12 : 10$
(C) $10 : 12$ (D) $10 : 13$

If the ratio of areas of two similar triangles is $100 : 144$ then the ratio of their corresponding sides is

- (A) $10 : 8$ (B) $12 : 10$
(C) $10 : 12$ (D) $10 : 13$

34. किसी वृत्त को दो अलग बिन्दुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं

- (A) जीवा (B) छेदक रेखा
(C) स्पर्श रेखा (D) इनमें से कोई नहीं

[110]
 ΔABC ,

J

[110]

A line which intersects a circle in two distinct points is called

- (A) Chord (B) Secant
 (C) Tangent (D) None of these

35. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ 4 : 9 के अनुपात में है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा ?

- (A) 9 : 4 (B) 16 : 81
 (C) 81 : 16 (D) 2 : 3

The corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 4 : 9. What will be the ratio of the areas of the triangles ?

- (A) 9 : 4 (B) 16 : 81
 (C) 81 : 16 (D) 2 : 3

36. $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ तथा $BC = 3$ सेमी, $EF = 4$ सेमी है। यदि ΔABC का क्षेत्रफल 54 सेमी² हो, तो ΔDEF का क्षेत्रफल है


- (A) 56 सेमी² (B) 96 सेमी²
 (C) 196 सेमी² (D) 49 सेमी²

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$ and $BC = 3$ cm, $EF = 4$ cm. If the area of ΔABC is 54 cm², then the area of ΔDEF is

- (A) 56 cm² (B) 96 cm²
 (C) 196 cm² (D) 49 cm²

37. किसी त्रिभुज ABC में $\angle A = 90^\circ$, $BC = 13$ सेमी, $AB = 12$ सेमी तो AC का मान है

- (A) 3 सेमी (B) 4 सेमी
 (C) 5 सेमी (D) 6 सेमी



SS/A/605

Page 15 of 44

$$AC = \sqrt{(AB)^2 - (BC)^2}$$

$$(12)^2 - (13)^2$$

$$144 - 169$$

$$-25$$

$$\sqrt{-25} = 5$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 13 \\ \hline 39 \\ 169 \\ \hline 169 \end{array}$$

J

[110]

In any $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, $BC = 13$ cm, $AB = 12$ cm ; then the value of AC is

- (A) 3 cm (B) 4 cm
(C) 5 cm (D) 6 cm

38. $\triangle DEF$ तथा $\triangle PQR$ में दिया है कि $\angle D = \angle Q$ तथा $\angle R = \angle E$, तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (A) $\angle F = \angle P$ (B) $\angle F = \angle Q$
(C) $\angle D = \angle P$ (D) $\angle E = \angle P$

In $\triangle DEF$ and $\triangle PQR$ it is given that $\angle D = \angle Q$ and $\angle R = \angle E$, then which of the following is correct ?

- (A) $\angle F = \angle P$ (B) $\angle F = \angle Q$
(C) $\angle D = \angle P$ (D) $\angle E = \angle P$

39. $\triangle ABC$ एवं $\triangle DEF$ इस प्रकार हैं कि $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{DF}$ एवं $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 80^\circ$ तो $\angle F$ की माप है

- (A) 30° (B) 45°
(C) 60° (D) 40°

$\triangle ABC$ and $\triangle DEF$ are such that $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{DF}$ and $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 80^\circ$; then the measure of $\angle F$ is

- (A) 30° (B) 45°
(C) 60° (D) 40°

[110]
value of

लिखित में

then

40°,

40°,

44

J

[110]

40. दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) अनगिनत

The number of common tangents of two intersecting circles is

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) infinitely many

41. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का 5 वाँ पद 11 एवं सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

If 5th term of an A.P. is 11 and common difference is 2 then what is its first term ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

42. n पदों वाले समांतर श्रेढ़ी का योग $n^2 + 2n + 1$ है तो इसका 6 वा पद है

- (A) 29 (B) 19
(C) 15 (D) इनमें से कोई नहीं

The sum of an A.P. with n terms is $n^2 + 2n + 1$ then its 6th term is

- (A) 29 (B) 19
(C) 15 (D) none of these

43. निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है ?

- (A) $1, 7, 9, 16, \dots$ (B) $x^2, x^3, x^4, x^5, \dots$
 (C) $x, 2x, 3x, 4x, \dots$ (D) $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

Which of the following is in an A.P. ?

- (A) $1, 7, 9, 16, \dots$ (B) $x^2, x^3, x^4, x^5, \dots$
 (C) $x, 2x, 3x, 4x, \dots$ (D) $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

44. निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ?

- (A) $1, 2, 3, 4, \dots$ (B) $3, 6, 9, 12, \dots$
 (C) $2, 4, 6, 8, \dots$ (D) $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

Which of the following is not in an A.P. ?

- (A) $1, 2, 3, 4, \dots$ (B) $3, 6, 9, 12, \dots$
 (C) $2, 4, 6, 8, \dots$ (D) $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

45. समांतर श्रेणी $1, 4, 7, 10, \dots$ के प्रथम 20 पदों का योगफल है

- (A) 500 (B) 540
 (C) 590 (D) 690

The sum of first 20 terms of the A.P. $1, 4, 7, 10, \dots$ is

- (A) 500 (B) 540
 (C) 590 (D) 690

46. निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है ?

(A) $\sin^2 60^\circ + \cos 60^\circ$

(B) $\sin 90^\circ \times \cos 90^\circ$

(C) $\sin^2 60^\circ$

(D) $\sin 45^\circ \times \frac{1}{\cos 45^\circ}$

Which of the following values is equal to 1 ?

(A) $\sin^2 60^\circ + \cos 60^\circ$

(B) $\sin 90^\circ \times \cos 90^\circ$

(C) $\sin^2 60^\circ$

(D) $\sin 45^\circ \times \frac{1}{\cos 45^\circ}$

47. $\cos^2 A (1 + \tan^2 A) =$

(A) $\sin^2 A$

(B) $\operatorname{cosec}^2 A$

(C) 1

(D) $\tan^2 A$

48. $\tan 30^\circ =$

(A) $\sqrt{3}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(D) 1

49. $\cos 60^\circ =$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(D) 1

J

[110]

50. $\sin^2 90^\circ - \tan^2 45^\circ =$

(A) 1

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

~~(D) 0~~

51. बिन्दु $(8 \sin 60^\circ, 0)$ तथा $(0, 8 \cos 60^\circ)$ के बीच की दूरी है

(A) 8

(B) 25

(C) 64

(D) $\frac{1}{8}$

The distance between the points $(8 \sin 60^\circ, 0)$ and $(0, 8 \cos 60^\circ)$ is

(A) 8

(B) 25

(C) 64

(D) $\frac{1}{8}$

52. यदि $O(0, 0)$ मूल बिन्दु हो तथा बिन्दु P के निर्देशांक (x, y) हों तो दूरी OP है

(A) $\sqrt{x^2 - y^2}$

☒ (B) $\sqrt{x^2 + y^2}$

(C) $x^2 - y^2$

(D) इनमें से कोई नहीं

If $O(0, 0)$ be the origin and co-ordinates of the point P be (x, y) then the distance OP is

(A) $\sqrt{x^2 - y^2}$

(B) $\sqrt{x^2 + y^2}$

(C) $x^2 - y^2$

(D) none of these

J53. y -अक्ष से बिन्दु $(12, 14)$ की दूरी है☒ (A) 12

(B) 14

(C) 13

(D) 15

The distance of the point $(12, 14)$ from the y -axis is

(A) 12

(B) 14

(C) 13

(D) 15

54. बिन्दु $(-6, -8)$ की कोटि है(A) -6 ☒ (B) -8

(C) 6

(D) 8

The ordinate of the point $(-6, -8)$ is(A) -6 (B) -8

(C) 6

(D) 8

55. बिन्दु $(3, -4)$ किस पाद में स्थित है ?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

☒ (C) तृतीय

(D) चतुर्थ

In which quadrant does the point $(3, -4)$ lie ?

(A) First

(B) Second

(C) Third

(D) Fourth

$$(12)^2 + (14)^2$$

$$144 + 196$$

$$340$$

$$14$$

$$\times 14$$

$$56$$

$$14$$

$$\hline 196$$

and

 (x, y)

J

[110]

56. निम्नलिखित में कौन-सा बिन्दु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ?

- (A) $(3, 2)$ (B) $(-3, 2)$
(C) $(3, -2)$ (D) $(-3, -2)$

Which of the following points lies in second quadrant ?

- (A) $(3, 2)$ (B) $(-3, 2)$
(C) $(3, -2)$ (D) $(-3, -2)$

57. बिन्दुओं $(4, -4)$ और $(-4, 4)$ को मिलानेवाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक हैं

- (A) $(4, 4)$ (B) $(0, 0)$
(C) $(0, -4)$ (D) $(-4, 0)$

The co-ordinates of the mid-point of the line segment joining the points $(4, -4)$ and $(-4, 4)$ are

- (A) $(4, 4)$ (B) $(0, 0)$
(C) $(0, -4)$ (D) $(-4, 0)$

58. रेखाखण्ड AB के मध्य बिन्दु $(2, 4)$ है और बिन्दु A के नियामक $(5, 7)$ हैं तो बिन्दु B के नियामक हैं

- (A) $(2, -2)$ (B) $(1, -1)$
(C) $(-2, -2)$ (D) $(-1, 1)$

The mid-point of line segment AB is $(2, 4)$ and the co-ordinates of point A are $(5, 7)$, then the co-ordinates of point B are

- (A) $(2, -2)$ (B) $(1, -1)$
(C) $(-2, -2)$ (D) $(-1, 1)$

59. किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक $(10, -6)$ तथा $(-6, 10)$ हैं तो वृत्त के केन्द्र के निर्देशांक हैं

- (A) $(-2, -2)$ (B) $(2, 2)$
(C) $(-2, 2)$ (D) $(2, -2)$

The co-ordinates of the ends of a diameter of a circle are $(10, -6)$ and $(-6, 10)$. Then the co-ordinates of the centre of the circle are

- (A) $(-2, -2)$ (B) $(2, 2)$
(C) $(-2, 2)$ (D) $(2, -2)$

60. यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक $(4, 6)$, $(0, 4)$ और $(5, 5)$ हों तो त्रिभुज के केन्द्रक के निर्देशांक हैं

- (A) $(5, 3)$ (B) $(3, 4)$
(C) $(4, 4)$ (D) $(3, 5)$

The co-ordinates of the vertices of a triangle are $(4, 6)$, $(0, 4)$ and $(5, 5)$ then the co-ordinates of the centroid of the triangle are

- (A) $(5, 3)$ (B) $(3, 4)$
(C) $(4, 4)$ (D) $(3, 5)$

61. निम्नलिखित में कौन-सा भिन्न का दशमलव प्रसार सांत है ?

- (A) $\frac{14}{2^0 \times 3^2}$ (B) $\frac{9}{5^1 \times 7^2}$
(C) $\frac{8}{2^2 \times 3^2}$ (D) $\frac{15}{2^2 \times 5^3}$

J

[110]

J

Which of the following fractions has terminating decimal expansion ?

(A) $\frac{14}{2^0 \times 3^2}$

(B) $\frac{9}{5^1 \times 7^2}$

(C) $\frac{8}{2^2 \times 3^2}$

(D) $\frac{15}{2^2 \times 5^3}$

62. $\frac{p}{2^n \times 5^m}$ के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है

(A) $\frac{101}{2^1 \times 5^2}$

(B) $\frac{101}{2^1 \times 5^3}$

(C) $\frac{101}{2^2 \times 5^2}$

(D) $\frac{101}{2^3 \times 5^2}$

In the form of $\frac{p}{2^n \times 5^m}$, 0.505 can be written as

(A) $\frac{101}{2^1 \times 5^2}$

(B) $\frac{101}{2^1 \times 5^3}$

(C) $\frac{101}{2^2 \times 5^2}$

(D) $\frac{101}{2^3 \times 5^2}$

63. यदि भाग एल्गोरिथ्म $a = bq + r$ में $b=4$, $q=5$ और $r=1$ हो तो a का मान क्या है ?

(A) 20

(B) 21

(C) 25

(D) 31

$$a = bq + r$$

$$a = 4 \times 5 + 1$$

$$a = 20 + 1$$

If in division algorithm $a = bq + r$, $b=4$, $q=5$ and $r=1$, then what is the value of a ?

(A) 20

(B) 21

(C) 25

(D) 31

J64. बहुपद $2x^2 - 4x - 6$ के शून्यक हैं

(A) 1, 3

(C) 1, -3

(B) -1, 3

(D) -1, -3

The zeroes of the polynomial $2x^2 - 4x - 6$ are

(A) 1, 3

(C) 1, -3

(B) -1, 3

(D) -1, -3

65. बहुपद $(x^3 + x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 1)$ का घात है

(A) 3

(C) 5

(B) 4

(D) 6

The degree of the polynomial $(x^3 + x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 1)$ is

(A) 3

(C) 5

(B) 4

(D) 6

66. निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ?

(A) $x^2 - 7$

(C) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 4$

(B) $2x^2 + 7x + 6$

(D) $x + \frac{4}{x}$

Which of the following is not a polynomial ?

(A) $x^2 - 7$

(C) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 4$

(B) $2x^2 + 7x + 6$

(D) $x + \frac{4}{x}$

J

[110]

67. निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 हैं ?

(A) $x^2 + 4$

(B) $x^2 - 4$

✓(C) $x^2 - 2x + 4$

(D) $x^2 + \sqrt{8}$

Which of the following quadratic polynomials has zeroes 2 and -2 ?

(A) $x^2 + 4$

(B) $x^2 - 4$

(C) $x^2 - 2x + 4$

(D) $x^2 + \sqrt{8}$

68. यदि बहुपद $t^2 + 7t + 10$ के शून्यक α एवं β हों तो $\alpha + \beta$ का मान है

(A) 7

$$\frac{C}{\alpha} \frac{10}{+2} \text{ (B) } 10$$

(C) -7

(D) -10

If α and β are the zeroes of the polynomial $t^2 + 7t + 10$ then the value of $\alpha + \beta$ is

(A) 7

(B) 10

(C) -7

(D) -10

69. $(\sin 30^\circ + \cos 30^\circ) - (\sin 60^\circ + \cos 60^\circ) =$

(A) -1

$$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

✓(C) 1

$$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

(D) 2

70. यदि द्विघात बहुपद $(k-1)x^2 + kx + 1$ का एक शून्यक -4 हो तो k का मान है

(A) $-\frac{5}{4}$

(B) $\frac{5}{4}$

(C) $-\frac{4}{3}$

(D) $\frac{4}{3}$

If one zero of the quadratic polynomial $(k-1)x^2 + kx + 1$ is -4 then the value of k is

(A) $-\frac{5}{4}$

(B) $\frac{5}{4}$

(C) $-\frac{4}{3}$

(D) $\frac{4}{3}$

71. k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण $kx^2 - 6x + 1 = 0$ के मूल वास्तविक एवं समान हैं ?

(A) 6

(B) 8

(C) 9

(D) 10

For what value of k , roots of the quadratic equation $kx^2 - 6x + 1 = 0$ are real and equal ?

(A) 6

(B) 8

(C) 9

(D) 10

72. यदि बहुपद $p(x)$ का एक शून्यक 2 हो, तो निम्नलिखित में कौन $p(x)$ का एक गुणखण्ड है ?

(A) $x-2$

(B) $x+2$

(C) $x-1$

(D) $x+1$

J

[110]

If one of the zeros of the polynomial $p(x)$ is 2 then which of the following is a factor of $p(x)$?

(A) $x-2$

(B) $x+2$

(C) $x-1$

(D) $x+1$

73. यदि बहुपद $cx^2 + ax + b$ के शून्यक α और β हों, तो $\alpha \cdot \beta$ का मान है

(A) $\frac{a}{c}$

(B) $\frac{-a}{c}$

(C) $\frac{b}{c}$

(D) $-\frac{b}{c}$

If α and β be the zeros of the polynomial $cx^2 + ax + b$ then the value of $\alpha \cdot \beta$ is

(A) $\frac{a}{c}$

(B) $\frac{-a}{c}$

(C) $\frac{b}{c}$

(D) $-\frac{b}{c}$

74. निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ?

(A) $(x+3)(x-3) = x^2 - 4x^3$ (B) $(x+3)^2 = 4(x+4)$

(C) $(2x-2)^2 = 4x^2 + 7$ (D) $4x + \frac{1}{4x} = 4x$

Which of the following is a quadratic equation ?

(A) $(x+3)(x-3) = x^2 - 4x^3$ (B) $(x+3)^2 = 4(x+4)$

(C) $(2x-2)^2 = 4x^2 + 7$ (D) $4x + \frac{1}{4x} = 4x$

J

75. निम्न

(A)

(C)

W

(A)

(C)

76. निम्न

77.

SS

J

75. निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है ?

(A) $5x - x^2 = x^2 + 3$

(B) $x^3 - x^2 = (x-1)^3$

(C) $(x+3)^2 = 3(x^2 - 5)$

(D) $(\sqrt{2}x+3)^2 = 2x^2 + 5$

Which of the following is not a quadratic equation ?

(A) $5x - x^2 = x^2 + 3$

(B) $x^3 - x^2 = (x-1)^3$

(C) $(x+3)^2 = 3(x^2 - 5)$

(D) $(\sqrt{2}x+3)^2 = 2x^2 + 5$

the value

76. द्विघात समीकरण $2x^2 - 7x + 6 = 0$ का विवेचक है

(A) 1

(B) -1

(C) 27

(D) 37

$d = b^2 - 4ac$
 $(-7)^2 - 4 \times 2 \times 6$
 $49 - 48$

The discriminant of the quadratic equation $2x^2 - 7x + 6 = 0$ is

(A) 1

(B) -1

(C) 27

(D) 37

77. निम्नलिखित में कौन बिन्दु $x = 2$ के लेखाचित्र पर है ?

(A) (2, 0)

(B) (2, 1)

(C) (2, 2)

(D) इनमें से सभी

Which of the following points lies on the graph of $x = 2$?

(A) (2, 0)

(B) (2, 1)

(C) (2, 2)

(D) all of these

J

[110]

78. यदि $P + 1, 2P + 1, 4P - 1$ समांतर श्रेणी में हैं तो P का मान है

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

If $P + 1, 2P + 1, 4P - 1$ are in A.P. then the value of P is

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

79. समांतर श्रेणी 1, 5, 9, ... का सार्व अंतर है

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

The common difference of arithmetic progression 1, 5, 9, ... is

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

80. समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, ... का कौन-सा पद 38 है ?

- (A) 10 वाँ (B) 11 वाँ
(C) 12 वाँ (D) 13 वाँ

Which term of the A.P. 5, 8, 11, 14, ... is 38 ?

- (A) 10th (B) 11th
(C) 12th (D) 13th

81. $\sin(90^\circ - A) =$

- (A) $\sin A$ (B) $\cos A$
(C) $\tan A$ (D) $\sec A$

[110]

J

[110]

82. यदि $\alpha = \beta = 60^\circ$ हो तो $\cos(\alpha - \beta)$ का मान है

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

~~(C) 0~~

(D) 2

If $\alpha = \beta = 60^\circ$ then the value of $\cos(\alpha - \beta)$ is

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) 0

(D) 2

83. यदि $\theta = 45^\circ$ हो तो $\sin \theta + \cos \theta$ का मान है

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sin 45 + \cos 45$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\sqrt{2}$

(C) $\frac{1}{2}$

~~(D) 1~~

If $\theta = 45^\circ$ then the value of $\sin \theta + \cos \theta$ is

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\sqrt{2}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 1

84. यदि $A = 30^\circ$ हो तो $\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ का मान है

(A) $2 \tan 30^\circ$

(B) $\tan 60^\circ$

(C) $2 \tan 60^\circ$

(D) $\tan 30^\circ$

If $A = 30^\circ$ then the value of $\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ is

(A) $2 \tan 30^\circ$

(B) $\tan 60^\circ$

(C) $2 \tan 60^\circ$

(D) $\tan 30^\circ$

J

85. यदि $\tan \theta = \frac{12}{5}$ हो तो $\sin \theta$ का मान है

(A) $\frac{5}{12}$

(B) $\frac{12}{13}$

(C) $\frac{5}{13}$

(D) $\frac{12}{5}$

If $\tan \theta = \frac{12}{5}$ then the value of $\sin \theta$ is

(A) $\frac{5}{12}$

(B) $\frac{12}{13}$

(C) $\frac{5}{13}$

(D) $\frac{12}{5}$

86. $\frac{\cos 59^\circ}{\sin 31^\circ} \times \frac{\tan 80^\circ}{\cot 10^\circ} =$

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) 1

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) $\frac{1}{2}$

87. यदि $\tan 25^\circ \times \tan 65^\circ = \sin A$ हो तो A का मान है

(A) 25°

(B) 65°

(C) 90°

(D) 45°

If $\tan 25^\circ \times \tan 65^\circ = \sin A$ then the value of A is

(A) 25°

(B) 65°

(C) 90°

(D) 45°

88. यदि $\cos \theta = x$ तो $\tan \theta =$

(A) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

(B) $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

(C) $\sqrt{1-x^2}$

(D) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

If $\cos \theta = x$ then $\tan \theta =$

(A) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

(B) $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

(C) $\sqrt{1-x^2}$

(D) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

89. $(1 - \cos^4 \theta) =$

(A) $\cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)$

(B) $\sin^2 \theta (1 + \cos^2 \theta)$

(C) $\sin^2 \theta (1 - \sin^2 \theta)$

(D) $\sin^2 \theta (1 + \sin^2 \theta)$

90. y -अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का रूप क्या है ?

(A) $(y, 0)$

(B) $(2, y)$

(C) $(0, x)$

(D) इनमें से कोई नहीं

What is the form of a point lying on y -axis ?

(A) $(y, 0)$

(B) $(2, y)$

(C) $(0, x)$

(D) None of these

91. निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 हैं ?

(A) $x^2 + 7x - 30$

(B) $x^2 - 7x - 30$

(C) $x^2 + 7x + 30$

(D) $x^2 - 7x + 30$

Which of the following quadratic polynomials has zeroes 3 and -10 ?

(A) $x^2 + 7x - 30$

(B) $x^2 - 7x - 30$

(C) $x^2 + 7x + 30$

(D) $x^2 - 7x + 30$

92. यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद है

(A) $x^2 - 3x - 2$

(B) $x^2 - 3x + 3$

(C) $x^2 - 2x + 3$

(D) $x^2 + 3x - 2$

If the sum of zeros of a quadratic polynomial is 3 and their product is -2 then that quadratic polynomial is

(A) $x^2 - 3x - 2$

(B) $x^2 - 3x + 3$

(C) $x^2 - 2x + 3$

(D) $x^2 + 3x - 2$

93. यदि $p(x) = x^4 - 2x^3 + 17x^2 - 4x + 30$ को $q(x) = x + 2$ से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है

(A) 6

(B) 3

(C) 4

(D) 5

If $p(x) = x^4 - 2x^3 + 17x^2 - 4x + 30$ is divided by $q(x) = x + 2$ then the degree of the quotient is

- (A) 6 (B) 3
(C) 4 (D) 5

94. $x + 2y + 3 = 0$, $3x + 6y + 9 = 0$ के कितने हल होंगे ?

- (A) एक हल (B) कोई हल नहीं
(C) अनगिनत हल (D) इनमें से कोई नहीं

How many solutions will $x + 2y + 3 = 0$, $3x + 6y + 9 = 0$ have ?

- (A) One solution
(B) No solution
(C) Infinitely many solutions
(D) None of these

95. दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हों तो हलों की संख्या होगी

- (A) 1 (B) 2
(C) अनगिनत (D) इनमें से कोई नहीं

If the graphs of two linear equations are parallel then the number of solutions will be

- (A) 1 (B) 2
(C) infinitely many (D) none of these

96. रैखिक समीकरण युग्म $5x - 4y + 8 = 0$ एवं $7x + 6y - 9 = 0$ है

(A) संगत

(B) असंगत

(C) आश्रित

(D) इनमें से कोई नहीं

The pair of linear equations $5x - 4y + 8 = 0$ and $7x + 6y - 9 = 0$ is

(A) consistent

(B) inconsistent

(C) dependent

(D) none of these

97. यदि द्विघात समीकरण $3x^2 - 5x + 2 = 0$ के मूल α एवं β हों तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान है

(A) $\frac{13}{9}$

(B) $\frac{9}{13}$

(C) $\frac{5}{3}$

(D) $\frac{3}{5}$

If α and β are roots of the quadratic equation $3x^2 - 5x + 2 = 0$ then the value of $\alpha^2 + \beta^2$ is

(A) $\frac{13}{9}$

(B) $\frac{9}{13}$

(C) $\frac{5}{3}$

(D) $\frac{3}{5}$

98. यदि द्विघात समीकरण $2x^2 - 7x - p = 0$ का एक मूल 2 हो तो p का मान है

(A) 4

(B) -4

(C) -6

(D) 6

If one root of the quadratic equation $2x^2 - 7x - p = 0$ is 2 then the value of p is

- (A) 4 (B) -4
(C) -6 (D) 6

99. यदि द्विघात समीकरण $2x^2 - x - 6 = 0$ का एक मूल $\frac{-3}{2}$ है तो इसका दूसरा मूल है

- (A) -2 (B) 2
(C) $\frac{3}{2}$ (D) 3

If one root of the quadratic equation $2x^2 - x - 6 = 0$ is $\frac{-3}{2}$ then its another root is

- (A) -2 (B) 2
(C) $\frac{3}{2}$ (D) 3

100. द्विघात समीकरण $2x^2 - 6x + 3 = 0$ के मूलों की प्रकृति क्या है ?

- (A) वास्तविक एवं असमान (B) वास्तविक एवं समान
(C) वास्तविक नहीं (D) इनमें से कोई नहीं

What is the nature of the roots of the quadratic equation $2x^2 - 6x + 3 = 0$?

- (A) real and unequal (B) real and equal
(C) not real (D) none of these

खण्ड - ब / SECTION - B

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।

$$15 \times 2 = 30$$

Question Nos. 1 to 30 are Short Answer Type Questions. Answer any 15 questions. Each question carries 2 marks.

$$15 \times 2 = 30$$

1. सिद्ध करें कि $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$.

Prove that $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$.

2. सिद्ध करें कि $\tan 9^\circ \cdot \tan 27^\circ = \cot 63^\circ \cdot \cot 81^\circ$.

Prove that $\tan 9^\circ \cdot \tan 27^\circ = \cot 63^\circ \cdot \cot 81^\circ$.

3. यदि $\cos A = \frac{4}{5}$ हो तो $\cot A$ और $\operatorname{cosec} A$ के मान ज्ञात करें।

If $\cos A = \frac{4}{5}$ then find the values of $\cot A$ and $\operatorname{cosec} A$.

4. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो।

Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365.

5. दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है। इस कथन के लिए समीकरण लिखें।

The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Write the equation for this statement.

J

6. किसी त्रिभुज PQR में दो बिन्दु S और T भुजाओं PQ तथा PR पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ तथा $\angle PST = \angle PRQ$, तो सिद्ध करें कि ΔPQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

In a triangle PQR , two points S and T are on the sides PQ and PR respectively such that $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ and $\angle PST = \angle PRQ$, then prove that ΔPQR is an isosceles triangle.

7. यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी एवं इसकी ऊँचाई 24 सेमी है तो इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

If the radius of base of a cone is 7 cm and its height is 24 cm then find its curved surface area.

8. एक घड़ी की मिनट की सूई की लंबाई 7 सेमी है। 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें।

The length of the minute hand for a clock is 7 cm. Find the area swept by it in 40 minutes.

9. सिद्ध करें कि $\tan 7^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 83^\circ = \sqrt{3}$.

Prove that $\tan 7^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 83^\circ = \sqrt{3}$.

10. सिद्ध करें कि $5 - \sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।

Prove that $5 - \sqrt{3}$ is an irrational number.

11. k के किस मान के लिए बिन्दुएँ $(1, 1)$, $(3, k)$ और $(-1, 4)$ संरेख हैं ?

For what value of k points $(1, 1)$, $(3, k)$ and $(-1, 4)$ are collinear ?

$$\begin{array}{r} 22 \\ \times 24 \\ \hline 88 \\ 44 \\ \hline 528 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ \times 5 \\ \hline 200 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 154 \\ \times 40 \\ \hline 6160 \end{array}$$

J

[110]

12. y -अक्ष पर एक ऐसा बिन्दु ज्ञात करें जो बिन्दुओं $(6, 5)$ और $(-4, 3)$ से समदूरस्थ हो।

Find such a point on y -axis which is equidistant from the points $(6, 5)$ and $(-4, 3)$.

13. एक 7 मी लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30° का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिन्दु की ऊँचाई ज्ञात करें जहाँ सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है।

A ladder 7 m long makes an angle of 30° with the wall. Find the height of the point on the wall where the ladder touches the wall.

14. एक समांतर चतुर्भुज $ABCD$ की भुजा AD के बढ़े भाग पर E एक बिन्दु है एवं BE , CD को F पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध करें कि $\triangle ABE \sim \triangle CFB$.

E is a point on the extended part of the side AD of a parallelogram $ABCD$ and BE intersects CD at F ; then prove that $\triangle ABE \sim \triangle CFB$.

15. ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका $\angle C$ समकोण है। सिद्ध करें कि $AB^2 = 2AC^2$.

ABC is an isosceles right triangle with $\angle C$ as right angle. Prove that $AB^2 = 2AC^2$.

16. द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$ के मूल ज्ञात करें।

Using quadratic formula find the roots of the equation $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$.

17. $3 + 11 + 19 + \dots + 67$ का योगफल ज्ञात करें।

Find the sum of $3 + 11 + 19 + \dots + 67$.

18. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का 5 वाँ एवं 9 वाँ पद क्रमशः 43 एवं 79 हैं तो समांतर श्रेढ़ी ज्ञात करें।

J

If 5th
A.P.

19. $x^3 + 1$

Divid

20. यूक्लिड

Usin

21. द्विघात

करें।

Fin

an

22. उस

रे

23.

24.

25.

If 5th and 9th terms of an A.P. are 43 and 79 respectively, find the A.P.

19. $x^3 + 1$ को $x + 1$ से भाग कीजिए।

Divide $x^3 + 1$ by $x + 1$.

20. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का म.सं. ज्ञात करें।

Using Euclid's vision algorithm, find the H.C.F. of 504 and 1188.

21. द्विघात समीकरण $2x^2 + 5x - 3 = 0$ के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें।

Find the discriminant of the quadratic equation $2x^2 + 5x - 3 = 0$ and find the nature of the roots also.

22. उस बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिन्दुओं $(-1, 7)$ और $(4, -3)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड को $2 : 3$ के अनुपात में अंतःविभाजित करता है।

Find the co-ordinates of the point which divides line segment joining the points $(-1, 7)$ and $(4, -3)$ in the ratio $2 : 3$ internally.

23. त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक $(-5, -1)$, $(3, -5)$ तथा $(5, 2)$ हैं।

Find the area of the triangle whose vertices are $(-5, -1)$, $(3, -5)$ and $(5, 2)$.

24. किसी घन का विकर्ण $9\sqrt{3}$ सेमी है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें।

The diagonal of a cube is $9\sqrt{3}$ cm. Find the total surface area of cube.

25. यदि $\tan \theta = \frac{5}{12}$ हो तो $\sin \theta + \cos \theta$ का मान ज्ञात करें।

If $\tan \theta = \frac{5}{12}$ then find the value of $\sin \theta + \cos \theta$.

26. यदि $\sin 3A = \cos(A - 26^\circ)$ हो जहाँ $3A$ एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात करें।

If $\sin 3A = \cos(A - 26^\circ)$, where $3A$ is an acute angle, then find the value of A .

27. दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की $\frac{7}{3}$ गुनी है ; तो संख्याएँ ज्ञात करें।

The sum of two numbers is 50 and one number is $\frac{7}{3}$ times of the other ; then find the numbers.

28. $AB = AC$ वाले एक समद्विबाहु $\triangle ABC$ की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिन्दु है। यदि $AD \perp BC$ और $EF \perp AC$ है, तो सिद्ध करें कि $\triangle ABD \sim \triangle ECF$ है।

E is a point on side CB produced of an isosceles $\triangle ABC$ with $AB = AC$. If $AD \perp BC$ and $EF \perp AC$, prove that $\triangle ABD \sim \triangle ECF$.

29. एक $\triangle ABC$ की भुजाएँ AB और BC तथा माधिका AD एक अन्य $\triangle PQR$ की भुजाओं PQ और PR तथा माधिका PM क्रमशः समानुपाती हैं तो सिद्ध करें कि $\triangle ABC \sim \triangle PQR$.

Sides AB and BC and median AD of a $\triangle ABC$ are respectively proportional to sides PQ and PR and medium PM of another $\triangle PQR$. Then prove that $\triangle ABC \sim \triangle PQR$.

30. $\triangle ABC$ तथा $\triangle DEF$ समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेमी^2 तथा 64 सेमी^2 हैं। यदि $DE = 5.1 \text{ सेमी}$ हो तो AB ज्ञात करें।

$\triangle ABC$ and $\triangle DEF$ are similar and their areas are 9 cm^2 and 64 cm^2 respectively. If $DE = 5.1 \text{ cm}$ then find AB .

J**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions**

प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। $4 \times 5 = 20$

Question Nos. 31 to 38 are Long Answer Type questions. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks. $4 \times 5 = 20$

31. रैखिक समीकरण युग्म $x + 3y - 6 = 0$ तथा $2x - 3y - 12 = 0$ का आलेख खींचें तथा हल करें।

Draw the graphs of the pair of linear equations $x + 3y - 6 = 0$ and $2x - 3y - 12 = 0$ and solve them.

32. सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएँ आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं।

If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides included between these angles are proportional then prove that the triangles are similar.

33. दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की चार गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की दुगुनी है तो संख्या ज्ञात करें।

A two digit number is four times of the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the number.

34. 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचें और इसे 5 : 8 के अनुपात में विभाजित करें। दोनों मापों को मापिए।

Draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5 : 8. Measure both parts.

35. सिद्ध करें कि $\frac{(\sec \theta - \tan \theta)}{(\sec \theta + \tan \theta)} = 1 + 2 \tan^2 \theta - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta$.

Prove that $\frac{(\sec \theta - \tan \theta)}{(\sec \theta + \tan \theta)} = 1 + 2 \tan^2 \theta - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta$.

36. दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो।

The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles.

37. निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें :

वर्ग अंतराल	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
बारंबारता	7	6	9	13	20	5	4

Find the mean of the following distribution :

Class-interval	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Frequency	7	6	9	13	20	5	4

38. एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई 4 सेमी है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप (परिधियाँ) 18 सेमी और 6 सेमी हैं। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।

The slant height of a frustum of a cone is 4 cm and the perimeters (circumferences) of its circular ends are 18 cm and 6 cm. Find the curved surface area of the frustum.